




آموزش سلامت دفتر پرستاری

آموزش مراقبت از فود قبل و بعد از جراحی (زیبائی سینه)(ماموپلاستی)

Anatomy of the Breast



بازنگری : زمستان ۱۴۰۱

تهیه و تنظیم: گروه آموزش پرستاری



اعمال جراحی مرکز شامل:

- ترمیم ناهنجاریها و آسیب های سر و صورت
- ترمیم انواع ناهنجاریهای دست-پیوند دست
- اصلاح ناهنجاریهای دهان و فک
- انواع اعمال جراحی زیبائی

اورژانس بیمارستان ۲۴ ساعته فعال و پذیرای کلیه بیماران اورژانسی، پیونددست، ترومای فک و صورت از کلیه نقاط کشور می باشد.

آدرس: تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- خیابان ۲۱

تلفن: ۸۸۷۱۷۲۷۲ - نمبر: ۸۸۷۱۵۲۱۶

www.crtfatima.iums.ac.ir

- جهت ترمیم هر چه سریعتر ناحیه عمل رژیم غذائی پرپروتئین و آبمیوه طبیعی بخصوص عصاره مرکبات، آب هویج، عسل و لبنت میل نمائید.

- از خواهیدن و وارد شدن فشار به ناحیه عمل خودداری نمائید و فقط به پشت بخوابید.

آموزش زمان ترجیحی:

- در صورت داشتن ترشح از ناحیه عمل یا قرمزی و تورم و احساس گرما به پزشک یا پرستار اطلاع دهید..

- حداقل به مدت یکماه بعد از عمل از کشیدن سیگار خودداری نمائید.

- طبق دستور پزشک حمام نمائید بطور معمول از روز دوم یا سوم بعد از عمل می توانید یک دوش سبک (به مدت ۷-۱۰ دقیقه) بگیرید از کشیدن لیف روی ناحیه عمل خودداری نمائید از شامپو خنثی استفاده کنید.
(شامپو بچه)

- از بروز هر گونه صدمه به ناحیه عمل پیشگیری کنید.

- مجدداً شروع به مصرف داروهایی که قبل از بیمارستان استفاده می کردید بکنید. ممکن است نیاز به مصرف آنتی بیوتیک های خوارکی تازمانی که درن ها کشیده شود داشته باشد


ماموپلاستی

ماموپلاستی به معنی ترمیم پستان به منظور زیبائی می باشد که با برداشتن چربی ، بافت غددی ، و پوست از سینه ، سبب ایجاد سایز سینه متناسب با بدن شما می گردد. اگر چه این عمل میتواند برای همه سنین مفید باشد، ولی بهتر است این عمل بعد از اینکه سینه ها رشد کامل کردند انجام شود. بیمارانی که قصد حامله شدن دارند باید عمل را بعد از کامل شدن افراد خانواده به تاخیر بیاندازند.

مراقبتهای قبل عمل:

- حداقل ۸ ساعت قبل از عمل ناشتا باشید و از خوردن هر گونه موادغذایی و مایعات خودداری نمایید.
- حمام کرده ، محل عمل را عاری از مو نمایید.
- قبل از عمل دندان مصنوعی ، لوازم زینتی، انگشتر و... را خارج نمایید

- سرفه و تنفس عمیق داشته باشید در صورت داشتن درد با گذاشتن دستها روی محل بخیه ها براحتی سرفه نمایید
- پانسمان روز چهارم برداشته می شود.
- درصورتیکه زختان ترشح دارد هر روز پانسمان را تعویض نمایید.
- درصورت داشتن درن ۷۲ تا ۲۴ ساعت بعد کشیده می شود.
- به مدت ۱۰ روز از فعالیت زیاد خودداری نمایید.
- بخیه های اطراف نوک سینه معمولاً ۸ روز بعد و بخیه های زیرسینه ۱۲ روز بعد کشیده می شود.
- سوتین طبی را بطور مرتب استفاده نمایید.(به مدت ۲ماه شب و روز غیر از زمان استحمام)



- ناخنها یتان را کوتاه نمایید و لاک نداشته باشید

- مصرف سیگار از ۴ هفته قبل از عمل جراحی قطع شود. در صورتیکه عمل جراحی کوچک باشد، قطع سیگار از ۲ هفته قبل از عمل ضروری است.

- در صورتیکه آسپرین یا داروهای رقیق کننده خون مصرف میکنید قبل از عمل به اطلاع پزشک برسانید (یک هفته قبل از عمل با نظر پزشک قطع نمایید).
- مصرف سایر داروها را به اطلاع پزشک و پرستار برسانید
- شب قبل از عمل استحمام کنید.

مراقبتهای بعد عمل :

- بالا نگه داشتن تنه (قراردادن دو بالش زیر سر و شانه ها یا نیمه نشسته) جهت کاهش ورم حدائقل به مدت یک هفته .

- در ۲۴ ساعت اول که در تخت قرار دارید پاهای دستهایتان را در تخت حرکت دهید.